



中华人民共和国国家标准

GB 22607—2008

莠去津可湿性粉剂

Atrazine wettable powders

自 2017 年 3 月 23 日起,本标准转为推荐性
标准,编号改为 GB/T 22607—2008。

2008-12-17 发布

2009-06-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准的第 3 章、第 5 章是强制性的,其余是推荐性的。

本标准的附录 A 为资料性附录。

本标准自实施之日起,原行业标准 HG 2217—1991《莠去津可湿性粉剂》作废。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国农药标准化技术委员会(SAC/TC 133)归口。

本标准负责起草单位:沈阳化工研究院。

本标准参加起草单位:山东潍坊润丰化工有限公司、中油吉林石化农药公司、青岛海利尔药业有限公司。

本标准主要起草人:王玉范、张雪冰、刘元强、刘宜纯、李学臣、唐丽莉、王世燕。

根据中华人民共和国国家标准公告(2017 年第 7 号)和强制性标准整合精简结论,本标准自 2017 年 3 月 23 日起,转为推荐性标准,不再强制执行。

莠去津可湿性粉剂


该产品有效成分 莠去津的其他名称、结构式和基本物化参数如下：

ISO 通用名称：Atrazine

CIPAC 数字代码：91

化学名称：2-氯-4-乙胺基-6-异丙氨基-1,3,5-三嗪

结构式：



实验式： $C_8H_{14}ClN_5$

相对分子质量：215.7(按 2007 年国际相对原子质量计)

生物活性：除草

熔点： $<175\text{ }^{\circ}\text{C}\sim 177\text{ }^{\circ}\text{C}$

蒸气压($20\text{ }^{\circ}\text{C}$)：0.04 mPa

溶解度($25\text{ }^{\circ}\text{C}$)：水中 30 mg/L, 三氯甲烷 52 g/kg、乙醚 12 g/kg、乙酸乙酯 28 g/kg、甲醇 18 g/kg、辛醇 10 g/kg

稳定性：在 $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ 下，中性介质中缓慢地水解为无除草活性的 6-羟基衍生物，在酸性或碱性介质中水解速度较快。土壤中 DT_{50} 60 d \sim 150 d

1 范围

本标准规定了莠去津可湿性粉剂的要求、试验方法以及标志、标签、包装、贮运。

本标准适用于由莠去津原药、适宜的助剂和填料加工成的莠去津可湿性粉剂。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 1600 农药水分测定方法

GB/T 1601 农药 pH 值的测定方法

GB/T 1604 商品农药验收规则

GB/T 1605—2001 商品农药采样方法

GB 3796 农药包装通则

GB/T 5451 农药可湿性粉剂润湿测定方法

GB/T 14825 农药悬浮率测定方法

GB/T 16150 农药粉剂、可湿性粉剂细度测定方法

GB/T 19136 农药热贮稳定性测定方法

3 要求

3.1 组成和外观：本品应由符合标准的莠去津原药剂制成，外观为均匀的疏松粉末，不应有团块。