



中华人民共和国国家标准

GB 7798—87

职业性铬鼻病诊断标准 及处理原则

Diagnostic criteria and principles of management
of occupational chromium induced nasal disease

1987-05-25 发布

1988-05-01 实施

中华人民共和国卫生部 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
职业性铬鼻病诊断标准
及处理原则

GB 7798—87

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1987年12月第一版 2005年11月电子版制作

*

书号:155066·1-26616

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

中华人民共和国国家标准

职业性铬鼻病诊断标准 及处理原则

UDC 616-057:616
-7/-8:613:632
GB 7798—87

Diagnostic criteria and principles of management
of occupational chromium induced nasal disease

铬酐、铬酸、铬酸盐及重铬酸盐等六价铬化合物引起的鼻部损害称为铬鼻病。

1 诊断原则

根据密切接触六价铬化合物的职业史和有关的临床表现，排除其他原因所致鼻部损害，结合作业环境劳动卫生学调查，方可诊断。

2 诊断标准

铬鼻病患者可有流涕、鼻塞、鼻衄、鼻干燥、鼻灼痛、嗅觉减退等症状，及鼻粘膜充血、肿胀、干燥或萎缩等体征。凡有以下鼻部体征之一者，即可诊断为铬鼻病。

- a. 鼻中隔粘膜糜烂，少数情况下为鼻甲粘膜糜烂；
- b. 鼻中隔粘膜溃疡；
- c. 鼻中隔软骨部穿孔。

3 治疗原则

以对症治疗为主。局部可应用硫代硫酸钠溶液或溶菌酶制剂；对鼻中隔穿孔患者，必要时可行鼻中隔修补术。

4 劳动能力鉴定

- 4.1 鼻粘膜糜烂较重患者，可暂时脱离铬作业。
- 4.2 鼻粘膜溃疡患者应暂时脱离铬作业，久治不愈者可考虑调离铬作业。
- 4.3 凡出现鼻中隔穿孔，应调离铬作业。

5 健康检查的要求

- 5.1 铬作业工人就业前体检应作耳鼻咽喉科检查，注意皮肤病史。
- 5.2 铬作业工人应每半年作耳鼻咽喉专科检查一次。

6 职业禁忌证

- a. 严重的慢性鼻炎、副鼻窦炎、萎缩性鼻炎及显著的鼻中隔偏曲；
- b. 严重的湿疹和皮炎。