



中华人民共和国国家标准

GB 7808—87

职业性黑变病诊断标准 及处理原则

Diagnostic criteria and principles of management
of occupational melanosis

1987-05-25 发布

1988-05-01 实施

中华人民共和国卫生部 发布

中 华 人 民 共 和 国
国 家 标 准
职业性黑变病诊断标准
及处理原则
GB 7808—87

*

中国标准出版社出版发行
北京西城区复兴门外三里河北街16号
邮政编码:100045

<http://www.spc.net.cn>

电话:63787337、63787447

1987年12月第一版 2005年11月电子版制作

*

书号: 155066·1-26626

版权专有 侵权必究
举报电话:(010)68533533

中华人民共和国国家标准

职业性黑变病诊断标准 及处理原则

UDC 616.5-057
: 616-7/-8
GB 7808—87

Diagnostic criteria and principles of management
of occupational melanosis

职业性黑变病是指劳动或作业环境中存在的职业性有害因素（主要是煤焦油、石油及其分馏产品，橡胶添加剂，某些颜料、染料及其中间体等）引起的慢性皮肤色素沉着性疾病。

1 诊断原则

根据职业接触史，在接触期间内发病，特殊的临床表现，病程经过，动态观察；参考作业环境调查等，综合分析，除外非职业性黑变病，排除其它色素沉着性皮肤病和继发性色素沉着症，方可诊断。

2 诊断标准

本病呈渐进性慢性经过，呈现以暴露部位为主的皮肤色素沉着，严重时泛发全身。可伴瘙痒及轻度乏力等症。具有下列条件者可诊断：

2.1 色素沉着前或初期，常有不同程度的红斑和瘙痒，待色素沉着较明显时，这些症状即减轻或消失。

2.2 皮损形态多呈网状或斑（点）状。有的可融合成弥漫性斑片，界限不清楚；有的呈现以毛孔为中心的小片状色素沉着斑。少数可见毛细血管扩张和表皮轻度萎缩。

2.3 颜色呈深浅不一的灰黑色、褐黑色、紫黑色等，在色素沉着部位表面往往有污秽的外观。

2.4 色素沉着部位以面颈等露出部位为主，可以发生在躯干、四肢或呈全身分布。

2.5 可伴有轻度乏力、头昏、食欲不振等全身症状。

3 治疗原则

避免继续接触致病物，对症治疗。

4 劳动能力鉴定

4.1 职业性黑变病一般不影响劳动能力。

4.2 职业性黑变病停止接触后一般消退较慢，恢复接触仍可复发，故确诊后应调换工种，避免继续接触致病物，必要时可调离发病环境。

5 健康检查的要求

长期从事接触煤焦油和石油分馏产品的工种及橡胶加工工作者，就业前体检应作皮肤科检查，注意皮肤色素的情况。定期体检时，遇有色素沉着应进行鉴别诊断。

6 职业禁忌证

患有黑变病和严重的色素沉着性皮肤病者不宜从事橡胶加工及接触矿物油类、某些染（颜）料等工作。